

Mjere izolacije pacijenata koji boluju od akutnih respiratornih infekcija

Tim za kontrolu bolničkih infekcija, Klinika za infektivne bolesti, 12/03/2020

Prilagođeno prema: Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) infection is suspected. Interim guidance. 25 January 2020. WHO/2019-nCoV/IPC/v2020.2
Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health care: WHO guidelines. Geneva: World Health Organization; 2014

Pacijent sa
simptomima akutne,
febrilne respiratorne
infekcije (ARI)



Standardne mjere predostrožnosti: higijena ruku,
- ako se očekuje špricanje: zaštita za oči
+ mjere KAPLJIČNE izolacije - medicinska maska unutar 1m

Pacijent:

- respiratorna higijena: maska ili rupčić kad se kiše i kašlje uz **HIGIJENU RUKU** svaki put kad se dira maska!!!
- po mogućnosti 1m između pacijenata



stock.com • 40853554

+
klinički i epidemiološki
podaci bitni za
pandemijsku ARI
npr. COVID-19



+ kontaktna izolacija: ogrtač, rukavice

+ aerosol izolacija: medicinska ili respirator* maska, zaštita za oči

Pacijent:

- zasebna soba, dobro ventilirana

Prijaviti epidemiologu

Uzeti bris na očekivanog pandemijskog uzročnika

- Respirator maska se preporuča kod postupaka koji stvaraju aerosol poput intubacije, neinvazivne ventilacije, traheotomije, kardiopulmonalne resusitacije, manualne ventilacije prije intubacije te bronhoskopije.
- Preporuka Tima: kod nesigurnosti u kvalificiranju postupka primijeniti višu razinu zaštite tj. respirator masku

